

بسمه تعالی



رشته: روانپزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
دانشکده پزشکی افضلی پور

دفترچه سوالات سی و چهارمین دوره آزمون
ارتقاء و گواهینامه تخصصی

مرداد ماه ۱۳۹۴

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره داوطلبی:

تعداد سوالات: ۱۵۲

تعداد صفحات: ۲۶

زمان پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تذکرات مهم:

- برای هر سوال تنها گزینه ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار دهید و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر اینصورت پس از پایان آزمون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.



۱- کدام یک از روشهای زیر یک آزمون فرافکن به شمار نمی آید؟

۱- Millon Clinical Multi axial inventories

۲- children's apperception test

۳- thematic apperception test

۴- story and sentence completion techniques

۲- مرد جوانی که سابقه بیماری روانپزشکی نداشته ، اخیراً دچار کاهش نیاز به خواب ، پرحرفی و بیقراری شده و در میان بازار اقدام به جمع کردن افراد نموده و یک سخنرانی مفصل فلسفی ایراد می نماید . به نظر شما اختلال در کدام یک از موارد زیر است ؟

۱- Orientation

۲- Judgment

۳- Cognition

۴- Insight

۳- یکی از مراجعین به درمانگاه روانپزشکی اظهارمیداد، جزئی از من همیشه می گوید باید فعالیت بیشتری داشته باشی ، اما جزء دیگر به او پاسخ می دهد این فعالیت ها هیچ فایده ای ندارد . روانپزشک می پرسد: صدای این مکالمه را می شنوید؟ مراجع دست خود را به علامت نفی تکان داده و می گوید ، به هیچ وجه شما فکر می کنید من دیوانه ام ! فقط یک احساس عجیب دارم . به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر وضعیت وی را توصیف می نماید.

۱- Pseudo hallucination

۲- eidetic imago

۳- Depersonalization

۴- Obsession

۴- مرد جوانی که با علائم روان پریشی در بخش روانپزشکی بستری شده است در حین مصاحبه سخنانش نامفهوم می شود. روانپزشک از وی می پرسد: متوجه این قسمت از حرفهایتان نشدم بیمار جواب می دهد : داشتم با زبان رمزی صحبت می کردم . کدام یک از گزینه های زیر علامت را توصیف می کند؟

۱- Neologism

۲- Coprophagia

۳- Legorrhea

۴- Cryptotalia

۵- مرد جوانی که اخیراً به مصرف مت آمفتامین روی آورده و به علت پرخاشگری ارجاع شده است ، مرتباً با ناخن هایش پوست خود را خراش داده و اعتقاد دارد ذرات شیشه را از آن خارج می نماید . به عقیده شما وی کدامیک از علائم زیر را نشان می دهد؟

۱- haptic hallucination

۲- Synesthesia

۳- illusion

۴- derealization



۶- یکی از مراجعین به روانپزشک اظهار می دارد که به تازگی توسط یک سوزن آلوده مبتلا به ویروس ایدز شده است . برای ارزیابی اینکه مراجع دچار هذیان می باشد یا خیر ، کدام سوال اهمیت کمتری دارد ؟

- ۱- چرا فکر می کنید به ایدز مبتلا شده اید ؟
- ۲- چقدر مطمئن هستید که آلوده شده اید ؟
- ۳- آیا ممکن است یک نفر شما را عمداً آلوده کرده باشد ؟
- ۴- اگر جواب آزمایشات شما منفی باشد ، قبول می کنید که اشتباه کرده اید !

۷- کدامیک از علائم زیر مربوط به اختلال در تصویر تن (Body image disturbance) نمی باشد ؟

- ۱- hemiagnosia
- ۲- apraxia
- ۳- hyperschemazia
- ۴- dymorphophobia

۸- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص آزمون (PANSS (Positive- negative syndrome scale) صحیح می باشد ؟

- ۱- علائم در چهار حیطه عمده مورد سنجش قرار می گیرد
- ۲- نمره دهی هر علامت بر اساس حیطه مورد سنجش متفاوت است
- ۳- هر علامت از یک تا هفت نمره می گیرد
- ۴- نمره دهی را می توان در ۱۰ تا ۲۰ دقیقه تکمیل کرد

۹- کدامیک از گزینه های زیر به توصیف یک علامت مربوط به کاتاتونیا نمی پردازد ؟

- ۱- بیمار حرکات معاینه کننده را تقلید می نماید
- ۲- در مقابل درخواست پزشک برای تغییر وضعیت خود از Prone به supine به شدت مقاومت کرده و خود را به تخت می فشارد.
- ۳- بیمار حرکات تکرار شونده دست داشته و مکرراً دست های خود را به حالت صلیب درآورده و سپس به وضعیت قبلی بر می گرداند
- ۴- بیمار به صورت تکرار شونده برای دور کردن افکار مزاحم به سر خود ضربه می زند

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر برای شروع روان درمانی تحلیلی مناسب تر می باشد ؟

- ۱- خانم دندانپزشک جوانی که اخیراً احساس خشم و نفرت از مادر خود داشته ، بطوریکه احساس می کند نمی تواند کار خود را به خوبی انجام دهد
- ۲- خانم جوان خانه داری که مکرراً به علت تصور آلوده بودن ، دستهای خود را مکرراً شسته و اکثر اوقات خود را در حمام یا دستشویی سپری می سازد
- ۳- مرد کارگر جوانی که در روزهای اخیر مکرراً به بی ارزشی زندگی فکر کرده و تصور می کند دست به هرکاری می زند موفقیت آمیز نمی باشد
- ۴- مرد بازنشسته میانسالی که اخیراً همسر خود را ازدست داده و در منزل به تنهایی زندگی می کند و احساس می کند زندگی دیگر مفهومی ندارد



۱۱- روانپزشک شماره تلفن خود را به مراجع داده و از او خواسته هر وقت که احساس خطر کرد و افکار خودکشی به ذهنش آمد قبل از هر اقدامی به وی زنگ بزند. به نظر شما وی از این اقدام با کدامیک از گزینه های زیر توجیه می شود؟

۱- Interpretation of transference

۲- Supportive psychotherapy

۳- Response prevention

۴- Evaluation of transference

۱۲- از behavioral activation برای کاهش علائم کدام اختلال استفاده می شود؟

۱- anxiety

۲- Obsession

۳- depression

۴- bulimia

۱۳- مراجع از روانپزشک می خواهد برای فراموش نمودن خاطرات دردناک ، وی را هیپنوز نماید. به نظر شما کدام گزینه پاسخ مناسب تری می باشد؟

۱- بعد از شروع جلسات رواندرمانی ، به موقع از این تکنیک استفاده خواهیم کرد

۲- بهتر است شما به یک هیپنوتراپیست مراجعه نمائید. این کار در حیطه کار آنهاست.

۳- قبل از انجام اولین جلسه هیپنوز باید مطلع باشید که ممکن است چند جلسه برای اینکار لازم باشد

۴- با هیپنوز نمی توان خاطرات دردناک را فراموش کرد و اگر هم فراموش کنید موقتی بوده و چاره کار نیست

۱۴- در خصوص تکنیک ISIDP(intensive- short- tem dynamic psycho therapy) کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱- تمایز مشخص بین مراحل جمع آوری اطلاعات ، فشار و چالش وجود ندارد

۲- در این روش بر تفسیر رویا تاکید ویژه ای شده است

۳- ارزش تفسیر انتقال متقابل بیشتر از تفسیر انتقال می باشد

۴- برای سوپرویزن ، ضبط مکالمه ها و توجه به روابط کلامی به اندازه گزارش نوشتاری هر جلسه ارزش دارد

۱۵- کدام گزینه در رابطه با تاریخچه رواندرمانی که در کتاب معروف استانلی جکسون تحت عنوان "Care of the psyche" تالیف شده صحیح می باشد؟

۱- براساس یک جدول زمانی وی به شرح روشهای مختلف رواندرمانی از قرون وسطا تاکنون می پردازد

۲- او با مطالعه عناصر اصلی در روان درمانی مانند گوش دادن و تخلیه هیجانی به آغاز روان درمانی در دوره یونان باستان می رسد

۳- با سرفصل قرار دادن جنبش روانکاوی در قرن ۱۹ به فراگیر شدن بقیه مکاتب روان درمانی در سالیان بعد می رسد

۴- با تاکید بر روشهای ابن سینا به عنوان پایه گذار روان درمانی به توجه غربی ها به طب شرقی پرداخته و سپس جریان پیشرفت روان درمانی را مطالعه می نماید

۱۶- در خصوص مسیرهای آینده در روانپزشکی کدامیک از گزینه های زیر کمتر مورد توجه خواهد بود؟

۱- توجه به اختلالات (Sub threshold) یعنی اختلالاتی که ضوابط تشخیصی را کامل نکرده ولی ممکن است به عنوان یک اختلال به درمان نیاز داشته باشند

۲- واکنش ها به تغییرات شرایطی از زندگی که الزاماً بیماری نبوده و واکنشی تطابقی به شمار می آیند ، هرچند ظاهراً ضوابط تشخیصی را کامل می نمایند

۳- یکسان سازی روشهای درمان دارویی و غیر دارویی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه

۴- انجام مطالعات بیشتر برای بررسی نیازهای بومی و ابعاد روش های مقرون به صرفه در نقاط مختلف دنیا



۱۷- براساس توصیف Kernberg کدامیک از گزینه های زیر در هسته اختلال شخصیت مرزی جا ندارد؟

۱- Chronic free floating anxiety

۲- Poly symptomatic neurosis

۳- shift toward primary process thinking

۴- Total impaired reality testing

۱۸- مرد میانسالی که خیلی به ظاهر خود اهمیت داده ، به درمانگر مراجعه نموده و از اینکه دیگران او را درک ننموده و همیشه تنهایش می گذراند شکایت دارد و اظهار می دارد همسر سابق من یک انسان ناسپاس به معنای واقعی بوده ، حالا که از من جدا شده مرا نزد همه سرافکنده نموده است . درمانگر می پرسد ممکن است شما اقدامی انجام داده باشید که باعث رنجش وی شده باشد ؟مراجع با برافروختگی می گوید می بینم که شما هم مثل دیگران فکر می کنید. به نظر شما کدام اختلال شخصیت مطرح می باشد ؟

۱- Narcissistic

۲- Borderline

۳- Dependent

۴- Histerionic

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با طبقه بندی DSM صحیح می باشد ؟

۱- پایه این طبقه بندی براساس شناسایی سایکو پاتولوژی بیماری ها می باشد

۲- از اول اکتبر ۲۰۱۵ از این سیستم کد گذاری بیماریها در ایالات متحده امریکا استفاده نخواهد شد

۳- در ویرایش پنجم همانند ویرایش های قبلی از اعداد رومی استفاده شده است

۴- بیشترین فاصله ویرایش این طبقه بندی بین ویرایش دوم و سوم بوده است

۲۰- پسر ۱۷ ساله ای با علائم " غذا نخوردن ، محدود بودن روابط اجتماعی و دوستان صمیمی ، صحبت کردن با فرشته ها (خود نوجوان می گوید) ، شکایت از اینکه مردم می خواهند او را بگیرند ، افت عملکرد تحصیلی و تواناییهای یادگیری ، درگیری با همیشرها بدلیل اینکه فکر می کند آنها وسایلشان را جا به جا می کنند." از حدود ۳ سال قبل تحت درمان دارویی می باشد را ویزیت می کنید .خانواده از بهبود وی رضایت نسبی دارند ولی از افزایش وزن ۲۵ کیلوگرمی او در طی مدت درمان شاکی اند و اصرار به تغییر دارو دارند . بهترین انتخاب کدام می باشد ؟ (توضیح : یکی از داروهای دریافتی بیمار قرص بی پریدین سه بار در روز می باشد)

۱- Haloperidol

۲- thiothexene

۳- Risperidone

۴- Clozapine

۲۱- کودکان مبتلا به Developmental Coordination Disorder در سن قبل از مدرسه در چه مهارت های حرکتی ضعیف هستند ؟

۱- drawing , hopping , crawling

۲- throwing ,jumping ,poor toddling

۳- handing fork ,walking , zipping

۴- sitting , riding bike, buttoning

۲۲- عملکرد اهمیت Fusiform gyrus در کودکان اتیسمی به کدامیک از موارد زیر مربوط است ؟

۱- Person Recognition

۲- Emotional Learning

۳- Social Cognition

۴- Direction of Eye Gaze



۲۳- والدین نوجوان ۱۳ ساله ای بیان می کنند پسرشان: پر حرف است و تقریباً همیشه بدون وقفه و خستگی ناپذیر حرف می زند بخصوص در زمینه هایی که اطلاعاتی را جمع آوری کرده باشد، دوستان متعددی دارد که معمولاً از آنها راضی نمی باشد زیرا بیشتر اوقات وی را دست می اندازند سعی در طرد کردن وی دارند، در اجتماعات خانوادگی گاهی چیزهایی می گوید که باعث خجالت آنها می شود زیرا هیچ تناسبی با موضوع مورد بحث و خصوصاً سن فرزندشان ندارد، گاهی منزوی می شود و از افسردگی و اضطراب شکایت می کند، دستخط و دیکته ضعیفی دارد ولی در ریاضی قوی می باشد. چه توصیه ای به والدین می کنید؟

۱- تجویز دارو برای اضطراب و افسردگی

۲- استفاده از معلم یا کلاس خصوصی برای تقویت دیکته و دستخط

۳- آموزش مهارتهای حل مساله خصوصاً در ارتباط با دوستانش

۴- آموزش مهارتهای خودکفایی در همه حیطه های عملکردی

۲۴- اولین بار در کدام Version از DSM اصطلاح اختلال نقص توجه - بیش فعالی (ADHD) به همراه کرایتریای سن شروع و مدت زمان استفاده شد؟

۱- DSM-I

۲- DSM-III-R

۳- DSM-II

۴- DSM-IV-TR

۲۵- کودک ۸ ساله ای به علت گم کردن وسایل، پاسخ ندادن به دستورات والدین، بلند شدن از صندلی سرکلاس درس، حرف زدن با بغل دستی حین صحبت کردن معلم و طولانی شدن انجام تکالیف درسی تحت درمان دارویی قرار می گیرد. والدین بعد از ۵ ماه درمان در آخرین ویزیت از تشدید علائم خصوصاً پرخاشگری، تحریک پذیری و پر تحرکی کودک در غروب ها شاکی هستند. بهترین انتخاب کدام می باشد؟

۱- قطع دارو های فعلی

۲- تغییر داروی قبلی به داروهای خط دوم

۳- تجویز دوز کمی از دارو قبل از غروب

۴- اضافه کردن آنتی سایکوتیک

۲۶- کودک ۹ ساله ای که از ۶/۵ سالگی به علت تیک های متعدد و مزمن حرکتی و گاهی تیک های صوتی تحت درمان می باشد را ارجاع داده اند. در حال حاضر از افت تحصیلی، گم کردن وسایل، از این شاخ به آن شاخ پریدن، بیقراری، کاهش صبر و تحمل، فراموش کاری و ناتوانی در پی گیری کارهایش شاکی اند. احتمال بروز و اضافه شدن کدام بیماری در وی بیشتر است؟

۱- وسواسی - جبری

۲- اضطراب جدایی

۳- خلقی دو قطبی

۴- بیش فعالی و نقص توجه

۲۷- کدامیک از جملات زیر در مورد تشخیص های افتراقی اختلال دلبستگی واکنشی نادرست است؟

۱- بسیاری از کودکان طیف اتیسم دلبستگی ایمنی با مراقب اصلی شان ندارند.

۲- بچه های با تاخیرهای زبان دریافتی و بیانی ممکن است از نظر بالینی در برقراری ارتباط اجتماعی مشکل داشته باشند.

۳- شیر خوارانی که موقتاً یا دائماً مراقب خود را از دست می دهند ممکن است تصویر بالینی اختلال دلبستگی نوع مهار شده را بروز دهند.

۴- کودکان بیش فعال و تکانشی ممکن است از نظر اجتماعی مهار گسیخته به نظر برسند.



۲۸- کدامیک از مداخلات زیر جزء پیشگیری اولیه در کودکان و نوجوانان می باشد؟

- ۱- اقداماتی که در خانواده های کودکان و نوجوان مبتلا به بیماری روانپزشکی انجام می شوند.
- ۲- خدماتی را که همه کودکان و خانواده های آنها در یک منطقه جغرافیایی خاص دریافت می کنند .
- ۳- مداخلاتی که برای کودکانی که در ریسک بالای بیماری روانپزشکی اند ولی خانواده های آنها به دنبال درمان نیستند ، انجام می شوند .
- ۴- کارهایی که برای کودکانی که توسط عوامل خارجی مثل مشاورین مدرسه به دنبال پرخاشگری والدین شناسایی و انجام می شوند .

۲۹- برای کودک ۳ ساله ای که به علت جراحات شدید Self-induced در بخش کودکان بستری می باشد ، مشاوره درخواست شده است . در معاینه متوجه صورت پهن ، دستهای کوتاه و انگشتان کوتاه پاها، عقب ماندگی ذهنی و پرتحرکی کودک می شوید. والدین نیز از رفتارهای خودجرحی (Self-Injuries) ، کندن و زخمی کردن دستها و انگشتان وی ، رفتارهای پرخاشگرانه و مشکلات خواب کودک شاکی اند . تشخیص بیماری کودک کدام یک از سندرم های زیر می باشد ؟

۱- Prader-Willi

۲- Williams

۳- Rubinstein

۴- Smith- Magenis

۳۰- در برنامه آموزش دستیاری در رشته های مختلف پزشکی از جمله روانپزشکی در دستیابی به کفایت های مهم رفتاری ، مهارتی و علمی تاکید شده است . عبارت :

“Commitment to carrying out occupational responsibilities ,adherence to ethical principles, and sensitivity to patients of diverse backgrounds.”

۱- Interpersonal and communication skills

۲- Practice –based learning

۳- Medical knowledge

۴- Professionalism

۳۱- کودک ۹ ساله ای که به علت اختلال وسواسی- جبری تحت درمان است اخیراً از اجرای موسیقی و پاسخ دادن به سوالات معلم امتناع می کند. تشخیص بیماری وی چیست؟

۱- Transient Tic

۲- Social Phobia

۳- Major Depression

۴- Conduct Disorder

۳۲- کدامیک از موارد زیر پیش بینی کننده پاسخ مثبت به درمان با فلوئوکستین در اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان نمی باشد ؟

۱- سن بالاتر

۲- خودکشی کمتر

۳- انتظار بهبودی بیشتر

۴- وجود علائم اضطرابی



۳۳- کدامیک از مشکلات سلامت روان در فرزند خوانده ها (Adoptees) بیشتر از جمعیت عمومی نمی باشد؟

۱- مصرف مواد

۲- رفتارهای برونی سازی

۳- علائم سایکوز

۴- پرخاشگری

۳۴- کدام یک از موارد زیر از اجزاء System-based practice از معیارهای اعتبار بخشی کفایت های فارغ التحصیلان روانپزشکی می باشد؟

۱- Practicing cost-effective care

۲- sensitive to cultural, age, gender and disability issues

۳- Creation of therapeutic relationship with patients

۴- Application of research and statistical methods

۳۵- نوجوان ۱۶ ساله ای را که از کودکی بعزت کمبود توجه تحت درمان بوده است را ویزیت می کنید. در معاینه از قدرت استدلال بالایی برای موضوعات مختلف برخوردار است، احساس توانمند بودن در حد همیشگی دارد، وضعیت درسی مطلوب است ولی اخیراً "بیقرارتر شده است و خصوصاً" نگرانی والدین از انتخاب دوستان ناباب می باشد که منجر به تغییر ارادتگی و پوشش و تکیه کلامهای وی شده است. به داروهای تجویزی مثل قبل پاسخ مطلوب ندارد. گاهی صبح ها بهتر است ولی معمولاً عصرها پرخاشگری و تحریک پذیری اش بیشتر می شود. خواب وی تغییر چندانی نداشته است. بهترین اقدام کدام است؟

۱- جهت ارزیابی دقیق بستری می شود.

۲- اضافه کردن ۵۰ میلی گرم سر ترالین به درمان قبلی

۳- افزایش دوز داروی قبلی و اطمینان بخشی به والدین

۴- قطع داروی قبلی و شروع آنتی سایکوتیک آتی پیک

۳۶- تجویز مهار کننده های استیل کولین استراز در کدامیک از دمانس های زیر پاسخ کمتری می دهد؟

۱- Multi Infarct

۲- Alzhemiers

۳- Lewy body

۴- Traumatic Brain Injury

۳۷- درباره ترشح پرولاکتین کدام گزینه نا درست می باشد؟

۱- جدائی از والدین در دوران کودکی مستعد کننده هیپوپرولاکتینو ما است

۲- زندگی با پدر الکلیک مستعد کننده هایپر پرو لاکتیو ماست

۳- استرس فقط از طریق افزایش پرو لاکتین باعث گالاکتوره می شود

۴- کم کاری تیروئید از طریق TRH باعث افزایش پرولاکتین می شود

۳۸- سوگ عارضه دار یا (COMPLICATED) بدنبال چه نوع مرگی محمتمل تر می باشد؟

۱- فردیکه بدنبال چهارمین انفارکتوس میوکارد فوت می کند

۲- فردیکه دنبال تصادف بلا فاصله فوت می کند

۳- بیماری که بدنبال ابتلا به HIV و عوارض ناشی از ان فوت می کند

۴- بیماری که بدنبال عود سر طان پروستات فوت می کند



۳۹- مرد سالمندی که مبتلا به سرطان میباشد مدتی است که جهت کاهش درد از فرم تزریقی مورفین استفاده می کند . بدلیل مشکلات خاص بیمار درخواست تبدیل فرم تزریقی به خوراکی را دارد برای ایجاد اثرات ضد درد مشابه مورفین دوز اپیوئید خوراکی چند برابر مورفین تزریقی باید باشد؟

۱- ۲ برابر

۲- ۴ برابر

۳- ۶ برابر

۴- ۸ برابر

۴۰- اولین واکنش روانی در GRIEF کدام است؟

۱- بیقراری

۲- خشم

۳- احساس گناه

۴- انکار

۴۱- در بیماران سرطانی کدامیک از اختلالات روانپزشکی زیر بیشتر گزارش می شود؟

۱- Generalized Anxiety

۲- Major depressive

۳- Delirium

۴- Adjustment Dis

۴۲- کدامیک از موارد زیر بعنوان ریسک فاکتور ابتلا به الزایمر محسوب می شود؟

۱- جنس مرد

۲- تحصیلات ابتدائی

۳- معرف انتی اکسیدانها

۴- مصرف ضد التهاب های غیر استروئیدی

۴۳- مرد پنجاه ساله ای بدلیل بیقراری - اختلال در حافظه و هوشیاری و جهت یابی برای بررسی روانپزشکی معرفی شده است . در مصاحبه نامبرده از احساس خزیدن حشرات روی اندامها و سسکسه مداوم و پرش های عضلانی شاکی می باشد از نظر شما محتمل ترین تشخیص کدام نوع انسفالو پاتی می باشد؟

۱- اورمیک

۲- هپاتیک

۳- هیپو گلاسمیک

۴- هیپر تانسو

۴۴- کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های دمانس فرونتو تمپورال می باشد؟

۱- شروع تدریجی

۲- تغییر دیررس در زبان

۳- شروع در سنین بالاتر نسبت به الزایمر

۴- تغییر دیررس شخصیت



۴۵- همه دمانس های زیر جزو گروه Degenerative محسوب می شوند به جز

- ۱- Binswanger
- ۲- Lewy Body
- ۳- Parkinson
- ۴- Pick

۴۶- شروع اختلال شخصیتی و رفتاری در یک مرد شصت ساله علیرغم سالم ماندن عملکرد های شناختی به نفع کدامیک از دمانس های زیر می باشد؟

- ۱- Pick
- ۲- Lewy Body
- ۳- Alzheimer
- ۴- Huntigton

۴۷- مهمترین عامل پدید اورنده رفتارهای خشن و تهاجمی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- ۱- Brain injury
- ۲- Child abuse
- ۳- Television violence
- ۴- Epilepsy

۴۸- کدامیک از خصوصیات زیر از مشخصات آنسفالوپاتی کبدی محسوب نمی شود؟

- ۱- آستریکسی
- ۲- غیر طبیعی شدن EEG
- ۳- کاهش تعداد تنفس
- ۴- اختلال هوشیاری

۴۹- جوان بیست و پنج ساله ای به علت گیجی مراجعه کرده است. او از سه ماه قبل پس از دیدن خوابی ترسناک تصور می کند که روحش از جسمش جدا شده است. دچار بی اشتهائی - بیخوابی و بی انگیزگی شده است و وضعیت بالا بیانگر کدامیک از سندرم های زیر می باشد؟

- ۱- Brain Fag
- ۲- Zar
- ۳- Susto
- ۴- Spell

۵۰- همه خصوصیات زیر در دمانس ناشی از HIV دیده می شود. بجز

- ۱- آپاتی
- ۲- علائم حرکتی
- ۳- افکار پارانوئید
- ۴- سیر کند و آهسته



۵۱- میزان خورکشی در بیماران سرطانی چگونه است؟

۱- کمی بالاتر از جمعیت عمومی است

۲- برابر با جمعیت عمومی است

۳- اندکی پایین تر از جمعیت عمومی است

۴- سه برابر جمعیت عمومی است

۵۲- بیمار ۲۵ ساله ای به دلیل ابتلا تدریجی به فراموشی به درمانگاه آورده شده است بر اساس شرح حال وی شب ها بدتر می شود و چیزهایی می بیند که دیگران نمی بینند در این مدت بدون علت و مکرر به زمین می افتاد. در معاینه برادی کینزی و لرزش در حال استراحت دارد. سابقه مصرف دارو نیز ندارد. محتمل ترین تشخیص شما کدام است؟

۱- Pick

۲- Lewy Body

۳- Binswanger

۴- Alzhiemer

۵۳- خانم شصت ساله ای که چند سال پس از افسردگی و اختلال در حافظه و کارکرد اجرائی فوت کرده است در اتوپسی lewy body فقط در substantian nigra یافت شده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

۱- parkinson

۲- Lewy body

۳- Binswanger

۴- Hantington

۵۴- مرد شصت و پنج ساله مبتلا به بیماری پارکینسون تحت درمان با levodopa, trihexiphenidyl میباشد از سه روز قبل دچار اختلال هوشیاری و کاهش توجه و تمرکز و اختلال در جهت یابی به زمان شده است. کدام اقدام درمانی زیر نادرست می باشد؟

۱- تجویز ECT

۲- تجویز Chlorpromazine

۳- توصیه به مصرف quetiapine

۴- کاهش دوز trihexyphenidyl

۵۵- جهت بررسی عملکرد اجرائی (executive Function) کدام یک از تست های زیر مناسب نمی باشد؟

۱- Continues Performance test

۲- Tapping test

۳- Semantic fluency test

۴- go-no-go test

۵۶- آقای ۴۵ ساله ای که با علائم توهم و هذیان، پرخاشگری، افزایش فعالیت در بخش بستری می باشد. در آزمایشات سطح تری گلیسرید و کلسترول بالا می دارد، کدام یک از درمانهای زیر برای بیمار ارجح می باشد؟

۱- والپروات و ریسپریدون

۲- کاربا مازپین و ریسپریدون

۳- ریسپریدون

۴- کاربا مازپین



۵۷- بیمار ۴۰ ساله ای است که مدت ۵ سال به علت تشخیص delusional disorder از نوع Jealousy تحت درمان دارویی می باشد وی جدیداً به مدت دو هفته است که تحریک پذیر شده است و فقط سه ساعت می خوابد ، فکر می کند ارتباط خاص با امام زمان دارد و کاهش تمرکز پیدا نموده است . براساس DSM-IV-TR چه تشخیصی برای وی مطرح می باشد؟

۱- Delusional disorder + Biopolar I disorder

۲- Bipolar I disorder

۳- Bipolar disorder NOS

۴- Delusional disorder +Manic Episode

۵۸- کدام یک از داروهای زیر تأثیری بر درمان فاز مانیا ندارد؟

۱- Zonisamide

۲- Nimodipin

۳- Topiramate

۴- Verapamil

۵۹- کدام یک از موارد زیر در مورد موج alpha در EEG غلط می باشد؟

۱- موج غالب در فرد بیدار با چشمهای باز می باشد

۲- در افراد مسن معمولاً "تواتر موج الفا کاهش می یابد"

۳- ثبت این موج در نواحی خلفی مغز واضح تر است

۴- با انجام اعمال شناختی (مانند محاسبات عددی) موج الفا کاهش می یابد

۶۰- کدام یک از موارد زیر در رابطه با تأثیر رژیم غذایی بر اختلالات روانپزشکی غلط می باشد؟

۱- سطح پائین فولات سرم همراه با شیوع بالاتر افسردگی است

۲- سطح پائین omega3 همراه با شیوع بالاتر اختلال دو قطبی است

۳- سطح پائین omega3 همراه با شیوع بالاتر اسکیزوفرنیا است

۴- رابطه معکوس بین میزان تریپتوفان رژیم غذایی و میزان خودکشی وجود دارد

۶۱- در مورد فاز درمان Continuation در افسردگی کدام یک از موارد زیر غلط می باشد؟

۱- درمان با همان دارو ولی با دوز کمتر از فاز acute ادامه می یابد

۲- طول مدت این فاز معمولاً "۴-۹ ماه است"

۳- طول مدت درمان این فاز برای بیماران با افسردگی سایکوتیک طولانی تر است

۴- هدف از این فاز درمانی پیشگیری از وقوع Index episode می باشد

۶۲- در مورد مصرف داروهای تثبیت کننده خلق در دوران حاملگی ، کدام مورد غلط می باشد؟

۱- عوارض کاربامازپین بر روی جنین بیشتر از لیتیوم می باشد

۲- لاموتریجین همراه با افزایش خطر cleft lip در جنین می باشد

۳- سدیم والپرات می تواند سبب کاهش چشمگیر IQ شود

۴- احتمال وقوع SPINA BIFIDA در مصرف کاربامازپین و سدیم والپروات شبیه هم است



۶۳- خانم ۱۹ ساله ای دانشجوی ترم سوم دانشگاه با علائم افسردگی و افت تحصیلی مراجعه نموده است وی از دو ماه قبل کانابیس مصرف می کند. در مصاحبه با مادر وی مشخص می شود که در دو ترم قبل وی بسیار فعال بوده در بیشتر فعالیت های ورزشی شرکت داشته و رتبه اول دانشگاه بوده است. کدامیک از موارد زیر در مورد انتخاب استراتژی درمانی وی از اهمیت کمتری برخوردار است؟

- ۱- سن پائین شروع علائم
- ۲- وجود racing thought در مصاحبه
- ۳- مصرف کانابیس
- ۴- جنسیت

۶۴- در کدام یک از فرمهای اختلال دو قطبی زیر نقش زنتیک بارز نمی باشد؟

- ۱- اختلال دو قطبی با علائم سایکوتیک
- ۲- اختلال دو قطبی نوع II
- ۳- کوموربیدیتی با سر درد میگرن
- ۴- کوموربیدیتی با اختلال درد (PAIN DISORDER)

۶۵- بیمار خانم ۵۰ ساله ای با علائم افسردگی می باشد که در آزمایشات سطح کورتیزول بالائی داشته است. کدام یک از موارد زیر در مورد این بیمار صحیح نمی باشد؟

- ۱- احتمال عودهای مکرر و علائم سایکوتیک در وی بالا می باشد
- ۲- سطح کورتیزول بالا، اختصاصی (Speific) برای بیماری افسردگی می باشد
- ۳- سطح کورتیزول بالا در وی سبب ایجاد علائم فیزیکی بیماری کوشینگ نمی شود
- ۴- درمان دارویی یا ECT بهتر از سایکوتراپی تاثیر می گذارد

۶۶- در یک بیمار افسرده کدام یک از هذیانهای زیر Mood-incongruent می باشد؟

- ۱- همسر من به من خیانت میکند چون که من از نظر جنسی ناتوان هستم
- ۲- مرگ به من نزدیک می باشد چون مبتلا به یک سرطان شدید هستم
- ۳- وقتی من به خود کشی فکر می کنم، افکارم در فضا پخش می شود
- ۴- پایان دنیا نزدیک است و همه خواهند مرد

۶۷- بیمار ۵۵ ساله با علائم افسردگی از سه ماه قبل مراجعه نموده است در مصاحبه ابراز می دارد تمام دارائیش را از دست داده است، اندامهای داخلی فاسد شده اند و وی مرده است، وی همچنین اشکالاتی در خواندن و هجی کردن کلمات دارد. با توجه به علائم فوق تومور کدام لوب مغزی بیشتر مطرح است؟

- ۱- فرونتال
- ۲- تمپورال
- ۳- پاریتال
- ۴- اکسی پیتال

۶۸- کدام یک در مورد نقش نوروپپتید اکسی توسین غلط می باشد؟

- ۱- در رفتارهای اجتماعی (social behavior) نقش دارد
- ۲- اثرات ضد اضطراب دارد
- ۳- سبب تسهیل رفتار جنسی می شود
- ۴- افزایش آن در اختلالات طیف اوتیسم گزارش شده است



۶۹- آقای بیست ساله با سابقه تشنج مقاوم به درمان از ۱۵ سالگی مراجعه می نماید . بعد از درمان چند داروئی ضد تشنج ، بیمار به مدت سه ماه دچار تشنج نشده است . اما خانواده وی ابراز می دارند که از ۲۰ روز قبل به طور ناگهانی فکر می کند کسانی در تعقیب وی هستند و به صورت واضح مذهبی تر شده است . کدام یک از موارد زیر در مورد وی صحیح می باشد؟

۱- تجویز توام چند داروئی ضد تشنج با عث علائم فوق شده است

۲- باید دوز داروهای ضد تشنج را کاهش داد

۳- باید لیتیوم به رژیم داروئی وی اضافه شود

۴- باید داروی انتی سایکوتیک تجویز شود

۷۰- بیمار ۶۰ساله با تشخیص پارکینسون مدت ها تحت درمان با لودوپا می باشد. اخیراً" در اکثر اوقات روز رفتارهای تکراری دارد مانند باز کردن و سائل خانه و دوباره سر هم کردن آنها ، خارج کردن و دوباره جای دادن کتابهای کتابخانه، کدام یک از موارد زیر این رفتارها را توجیه می کند؟

۱- Ideomotor apraxia

۲- Motor agnosia

۳- Punding

۴- Hyperkinetic movement disorder

۷۱- بیمار خانم ۶۰ ساله ای است که ۵ ماه قبل پسر ۲۵ ساله خود را در تصادف از دست داده است. از آن زمان وی در حالت سوگ می باشد. کدام یک از علائم زیر هشداردهنده احتمال ابتلا وی به MDD می باشد؟

۱- بیشتر وسائل فرزندش را به یک موسسه خیریه بخشیده است

۲- در طی این مدت یک کیلو کاهش وزن داشته است

۳- در پاسخ با اتفاقات خوب واکنش مثبت نشان می دهد

۴- عقیده دارد که علت مرگ فرزندش رفتن او به یک مراسم مذهبی خاص بوده است

۷۲- آقای ۲۱ ساله با اصرار مادرش به پزشک مراجعه نموده است . مادرش ذکر می کند از دو سال قبل متوجه شده که پسرش بعضی روزها پرحرف و بشاش می باشد و کارهایش را با انرژی خوب انجام می دهد و بعد از چند روز بدون دلیل خاصی کم حرف و در خود فرورفته می شود، گریه میکند و علاقه ای به کار کردن ندارد و در منزل می ماند .او ذکر می کند پسرش چند مرتبه شغلش را عوض نموده است و سابقه سوءمصرف مواد را نیز دارد بر اساس DSM-IV-TR چه تشخیصی مطرح می باشد؟

۱- Bipolar II

۲- Cyclothymia

۳- Bipolar IV

۴- Dysthymic- Like

۷۳- کدام یک از موارد زیر غلط می باشد؟

۱- افزایش میزان استرادیول در سیکل قاعدگی همراه با کاهش میزان خوردن است

۲- سطح leptin پلاسما در آقایان بیشتر از خانمها است

۳- میزان سطح leptin در خانمها با سطح استرادیول پلاسما ارتباط دارد

۴- تاثیر میزان استرادیول بر اندازه غذای مصرفی (meal size) بیشتر از تواتر مصرف (frequency) است

۷۴- ناحیه اصلی Basal ganglia که دریافت کننده نورونهای آوران است ، کدام قسمت می باشد؟

۱- substantia nigra

۲- striatum

۳- subthalamic nucleus

۴- Glubus palidus



۷۵- در پدیده **Transference** کدام عامل اهمیت کمتری دارد؟

۱- education

۲- socioeconomic

۳- age

۴- ethnicity

۷۶- بر اساس شواهد موجود در بیماران سرپائی مسن با افسرده گی خفیف نامتوسط بدون اختلال شخصیت که نسبتاً " سالم هستند و انگیزه کافی برای درمان دارند، کدام شیوه درمانی زیر مفیدتر است؟

۱- interpersonal psychotherapy

۲- supportive psychotherapy

۳- cognitive behavioral therapy

۴- Brief psychodynamic psychotherapy

۷۷- مصرف کدام یک از موارد زیر قدمت بیشتری دارد؟

۱- opium

۲- cannabis

۳- wine

۴- hallucinogens

۷۸- در بارگیری **Anabolic Androgenic steroid** کدام یک کاربرد کمتری دارد؟

۱- testosterone gel supplementation

۲- SSRIS

۳- Nonsteroidal anti-inflamators

۴- Naltrexon

۷۹- کدامیک از موارد زیر مستقیم بر گزیده های نیکو تینی اثر دارند. (nicotine partial agonist)

۱- Bupropion

۲- varenicline

۳- Nortriptylin

۴- clonidine

۸۰- در کدامیک از موارد زیر retention memory اختلال دارد؟

۱- trance

۲- fuge

۳- blackout

۴- werenicke-korsakoff syndrom

۸۱- مصرف کلوئیدین بمنظور سم زدائی در کدامیک از موارد زیر نیاز به احتیاط کمتری دارد؟

۱- اختلالات کلیوی یا متابولیک

۲- بیماریهای مزمن یا حاد قلبی

۳- کاهش فشار خون

۴- بیماری مزمن ریوی



۸۲- امکان ماندگاری علائم سندرم روان پریشی به علت مصرف مواد در کدامیک بیشتر است؟

- ۱- inhalants
- ۲- cannabis
- ۳- cocaine
- ۴- Amphetamins

۸۳- فردی برخی اوقات کارهایی را انجام می دهد که روز بعد نسبت به آنها فراموشی دارد همسر وی می گوید مطمئن است که با مصرف ماده ای چنین حالتی پیدا می کند مصرف کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟

- ۱- cocain
- ۲- Alcohol
- ۳- cannabis
- ۴- Amphetamin

۸۴- کدامیک از موارد زیر در سم زدائی مواد مخدر کم خطر تر است؟

- ۱- Buprenorphine
- ۲- Methadon
- ۳- Levomethadyl
- ۴- Nalmifene

۸۵- کدامیک از موارد زیر جزء اهداف درمان روانپزشکی در زندان نمی باشد؟

- ۱- کاهش رنج افراد مقیم در زندان
- ۲- اطمینان از ایمنی افراد مقیم در زندان
- ۳- مجوز استفاده از برنامه های زندان برای تمام افراد
- ۴- فراهم کردن داروهای مورد تقاضای زندانیان

۸۶- در کودکی با اختلالات خفیف نامتوسط شناختی مثل اختلال در توجه ،انجام اعمال ، نوشتن حروف و روایی کلمات با سابقه مصرف الکل در مادر چه شیوه پیشگیری قابل انجام بوده است؟

- ۱- کاهش مصرف الکل به حد اکثر ۱۲ الی ۲۴ گرم روزانه
- ۲- قطع کامل مصرف الکل
- ۳- دادن ویتامین B1300 در حین حاملگی
- ۴- بررسی ژنتیکی والدین قبل از حاملگی

۸۷- فردی که معتاد به الکل بوده است دچار quadriplegia , lethargia, cognitive impairment شده است . در ضمن اتاکسی و زوال عقل و اختلال در آگاهی نیز دارد در MRI نیز Corpus callosum نازک شده است . محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- ۱- Wernicke's
- ۲- Korsarkoff's
- ۳- marchia fara Bignami
- ۴- Delirium tremens

۸۸- علائم اختلال تعادل - تکلم بریده بریده ،نیستا گموس - اختلال در توجه و حافظه ،رفتار خشونت آمیز و اختلال قضاوت شده است . بیشتر سوء مصرف کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟

- ۱- هروئین
- ۲- کلوناز پام
- ۳- مسکالین
- ۴- کوکائین



۸۹- فردی را نزد شما آورده اند ۷۵ ساله ، میگوید اختلال در حافظه دارد که ابتدا حافظه کوتاه مدت مشکل پیدا کرده است فعلاً" فراموشی پیشرفت کرده است در ضمن علائمی از **Agnosia.Apraxia** را دارند در **mini-mental examination** نمره ۱۶ گرفته است ، اطرافیان حاضر بدرمان با داروهای شیمیائی نیستند ، کدامیک از موارد زیر کمتر در کمک بدرمان بیمار فوق مطرح است؟

۱- Ginkobibloba

۲- vitamin E

۳- Omega3 fatty acids

۴- st john's wort

۹۰- کدامیک از موارد اهداف رشد در میانسالی متوسط می باشد ؟

۱- to Accept the aging body

۲- to establish an adult work identity

۳- to develop adult form of play

۴- to accept changes in the relationship with grandchildren

۹۱- فردی در پایان بزرگسالی به شما مراجعه می کند در بررسی بیمار متوجه می شوید تفاسیر و برداشتهائی از تجاربش دارد که تعیین کننده رفتارها و احساسات او هستند که نیاز به تغییر دادن آنها وجود دارد . کدام شیوه درمانی زیر را پیشنهاد می کنید؟

۱- suppootive psychotherapy

۲- cognitive behavioral therapy

۳- individual psychotherapy

۴- insight orented psychotherapy

۹۲- امکان **Flush backs** در مصرف کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟

۱- Alcohol

۲- connabis

۳- cocaine

۴- Amphetamine

۹۳- برای بیماری با علائم اختلال افسردگی که شرح حال زخم معده نیز دارد . کدام داروی زیر مناسب تر است؟

۱- Doxepin

۲- Fluoxetine

۳- Desipramine

۴- Nortriptiline

۹۴- بیماری با علائم : خلق افسرده ، افکار مرگ و نیستی ، بی اشتنهائی و کندی پسیکوموتور مراجعه کرده ، در شرح حال ، سابقه یک دوره حمله مانیا دارد . از میان داروهای زیر کدامیک به تنهائی برای این بیمار قابل قبول تر است؟

۱- Risperidone

۲- Olanzapine

۳- quetiapine

۴- Aripiprazole



۹۵- خانمی در ماه دوم بارداری با حملات اضطرابی همراه با تعریق، احساس تنگی نفس و تپش قلب مراجعه کرده، ذکر می کند این حملات اضطرابی ارتباطی به موقعیت خاص ندارد و نگرانی از پیش آمد آنها باعث خانه نشین شدن وی شده است. کدام رژیم درمانی زیر برای این بیمار مناسب تر است؟

- ۱- شروع فلوکستین ۲۰ میلی گرم روزانه
- ۲- شروع سرتالین ۲۵ میلی گرم روزانه
- ۳- شروع پاروکستین ۲۰ میلی گرم روزانه
- ۴- شروع فلووکسامین ۵۰ میلی گرم روزانه

۹۶- بیماری که تحت درمان با داروی تیوریدازین است دچار بیقراری، توهم، تشنج، مردمک میدریاتیک و اختلال در جهت یابی شده است کدامیک از اقدامات زیر صحیح نیست؟

- ۱- قطع دارو
- ۲- تجویز Atropine
- ۳- تجویز Phyostigmine
- ۴- تجویز Dantrolene

۹۷- با توجه به نقش سیستم آنتی کلینرژیک در ایجاد دلیریوم، در کدامیک از داروهای زیر احتمال بیشتری برای دلیریوم هست؟

- ۱- Risperidone
- ۲- quetiapine
- ۳- Aripiprazole
- ۴- Olanzapine

۹۸- کدامیک از عوارض کاربامازپین وابسته به دز است؟

- ۱- سندرم استیون جانسون
- ۲- سرگیجه
- ۳- آنمی آپلاستیک
- ۴- پانکراتیت

۹۹- کدام گزینه زیر در مورد بوپرنورفین غلط است؟

- ۱- برای اثر ضد دردی نیازمند متابولیزم کبدی است
- ۲- پروفایل سلامت کلینیکی این دارو پائین است
- ۳- می توان این دارو را به صورت یک روز در میان تجویز کرد
- ۴- ترکیب بوپرنورفین - نالوکسان در خانمهای حامله استفاده نمی شود.

۱۰۰- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر نقش فارماکوکیتیک دارو است؟

- ۱- والپروات سطح سرمی لاموتریژین را افزایش می دهد
- ۲- داروهای سه حلقه ای باعث خشکی دهان می شوند
- ۳- لیتوم از اندکس درمانی پایینی برخوردار است
- ۴- بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرنده مو است



۱۰۱- به لحاظ تاریخچه کشف و استفاده از داروهای روانپزشکی، کدامیک از داروهای زیر قدیمی ترند؟

۱- Chlorpromazine

۲- chlordiazpoxide

۳- Lithium

۴- Phenobarbital

۱۰۲- کدام جمله زیر در مورد مقایسه **Venlafaxine** با **duloxetine** غلط است؟

۱- مکانیزم اثر مشابهی دارند

۲- در صورت قطع ناگهانی هر دو سندرم قطع دارند

۳- هر دو پاسخ **dosage response curve** دارند

۴- تهوع شایعترین عارضه هر دویست که ممکن است به قطع دارو بیانجامد

۱۰۳- بیماری که سالها تحت درمان با انواع داروهای آنتی پسیکوتیک است دچار حرکات غیر ارادی و نامنظم کره آنتوز

اطراف دهان و زبان شده است کدامیک از گزینه های زیر به نفع تشخیص دیسکنیری دیررس در این بیمار نیست؟

۱- تشدید حرکات بوسیله استرس و ناپدید شدن آن در خواب

۲- وجود اختلال خلقی در بیمار

۳- امکان تشدید علائم حرکتی با قطع داروهای آنتاگونیست دوپامین

۴- بیمار در سنین جوانی باشد

۱۰۴- این مفهوم که: کودک در غیاب پدر کلاه او را بر سر می گذارد و ادای او را در می آورد بیانگر کدامیک از مراحل

رشدی پیازه است؟

۱- Concrete operation

۲- Preoperatioal

۳- Formal operation

۴- Sensorimotor

۱۰۵- کدامیک از رفتارهای زیر نشانگر حافظه شفاف (**Explicit**) است؟

۱- فردی که به دنبال سانه دچار کابوس شبانه می شود.

۲- فردی که به صورت عادت رفتار را انجام می دهد

۳- بیمار دمانسی که راه منزل را گم می کند

۴- مار گزیده ای که از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

۱۰۶- فردی که سالها اعتیاد خود را کنار گذاشته، اداره یکی از گروههای **N.A.** (معتادان گمنام) را بر عهده دارد این

مطلب بیانگر کدام مکانیزم دفاعی است؟

۱- displacement

۲- Denial

۳- Sublimation

۴- Altruism



۱۰۷- براساس مطالعه سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۰، بالاترین سالهای طی شده با ناتوانی (DALY) مربوط به چه بیماری است؟

- ۱- افسردگی اساسی
- ۲- بیماریهای ایسکمیک قلبی
- ۳- بیماریهای عفونی
- ۴- سوء مصرف مواد

۱۰۸- فردی که ازدواج موفق داشته ولی در زندگی مشترک صاحب فرزند نشده و احساس خلایقیت ندارد، در کدامیک از مراحل رشدی اریکسونی دچار رکود است؟

- ۱- Intimacy vs isolation
- ۲- Generativity vs Stagnation
- ۳- Industry vs inferiority
- ۴- Initiation vs guilt

۱۰۹- در آزمونی که قرار است اختلالات افسردگی اساسی را تست کند از خلق افسرده سوال نشده است، این آزمون در کدامیک از مفاهیم زیر اشکال دارد؟

- ۱- Content validity
- ۲- Criterion validity
- ۳- Construct validity
- ۴- Predictive validity

۱۱۰- این موضوع که پیش آگهی اسکیزوفرنی در جوامع شرقی بهتر از کشورهای صنعتی است بیانگر کدام نقش فرهنگ در ارتباط با بیماریهای روانی است؟

- ۱- Pathogenic or pathoplastic agent
- ۲- Diagnostic or Nosological tool
- ۳- Interpretive or Explanatory tool
- ۴- Therapeutic or protective factor

۱۱۱- برای بیماری که با اولین حمله مانیا پاسخ درمانی مناسبی به لیتوم داشته وجود کدامیک از خصوصیات زیر پیش بینی کننده فایده درمانی بالیتوم در فاز نگهدارنده (maintenance) است؟

- ۱- ریسک بالای خودکشی داشته باشد
- ۲- شروع تدریجی اولین دوره بیماری
- ۳- سیستم حمایتی مناسبی داشته باشد
- ۴- وجود عامل تشدید کننده برای اولین اپیزود

۱۱۲- مرد جوانی از سه ماه قبل معتقد است حرکات اندام هایش از بیرون کنترل می شود. در یک ماه اخیر علائم پرحرفی، کاهش نیاز به خواب، بی قراری و تحریک پذیری و خلق بالا نیز به تابلوی وی افزوده شده است. اطلاعاتی از میزان افت عملکرد وی در دست نیست. براساس همین علائم و یافته ها تشخیص وی براساس ICD-10 کدام است؟

- ۱- Schizophrenia
- ۲- Schizophrenia-like disorder
- ۳- Schizoaffective disorder
- ۴- Schizophreniform disorder



۱۱۳- خانم ۲۵ ساله ای با شکایت از اضطراب و توهم شنوایی که تقریباً یک بار در هفته و در بیداری اتفاق می افتد مراجعه کرده است. وقوع تجربه توهمی وی با استرسهای محیطی مرتبط به نظر می رسد. بررسی از نظر اختلالات طبی عمومی و سوء مصرف مواد منفی می باشد. بیمار علامت یا نشانه دیگری ندارد. چه اقدامی از نظر درمانی ارجح می باشد؟

۱- داروی آنتی سایکوتیک با دوز کامل

۲- داروی ضد تشنج با دوز کافی

۳- درمان علائم اضطرابی همراه

۴- نیاز به اقدام خاصی ندارد

۱۱۴- مردی ۲۴ ساله حدود یک و نیم سال گذشته به تدریج کم حرف و گوشه گیر شده و هیچ علاقه ای به پیدا کردن شغل، ازدواج یا تحصیل نشان نمی دهد و اغلب در اطاقش به تنهایی به سر می برد و به نظافت شخصی خود رسیدگی نمی کند. در مقایسه با فردی مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید کدام احتمالات زیر در مورد وی صدق می کند؟

۱- خودکشی بیشتر، انطباق اجتماعی قبل از بیماری ضعیف تر، پاسخ به درمان دارویی ضعیف تر

۲- خودکشی کمتر، انطباق اجتماعی قبل از بیماری ضعیف تر، پاسخ به درمان دارویی ضعیف تر

۳- خودکشی بیشتر، انطباق اجتماعی قبل از بیماری بهتر، پاسخ به درمان دارویی بهتر

۴- خودکشی کمتر، انطباق اجتماعی قبل از بیماری بهتر، پاسخ به درمان دارویی بهتر

۱۱۵- در مورد خانم جوانی مبتلا به اسکیزوفرنیا که به تازگی از بیمارستان مرخص گردیده است و به بیماری خود بصیرت پیدا نموده است، کدام یک جزو عوامل افزایش دهنده ریسک خودکشی نمی باشد؟

۱- سن

۲- بصیرت

۳- جنسیت

۴- فاصله زمانی از بستری

۱۱۶- کدام یک از موارد زیر به نفع نظریه " اسکیزوفرنیا به عنوان یک اختلال عصبی تکاملی (neurodevelopmental) " نمی باشد؟

۱- وجود تغییرات مغزی در شروع بیماری

۲- وجود درصد بیشتر آنومالی های مینور جسمی در کودکانی که بعد ها مبتلا می شوند

۳- وجود اختلالات شناختی در سنین قبل از شروع بیماری

۴- تغییرات مغزی پس از شروع بیماری

۱۱۷- در مطالعه بر روی بیماران سایکوتیک (اعم از اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو و بای پولار) کدام دسته از شواهد زیر به نفع دیکوتومی کرپلین می باشد؟

۱- در مطالعات فوق همه تشخیص های مذکور، در فاکتور سایکوز با هم همپوشانی داشته اند

۲- بیشترین ارتباط ژنها با فاکتورها (شامل مانیا، دپرشن، علائم مثبت، علائم منفی، دیس ارگانیزیشن) بوده است، نه با طبقات تشخیصی

۳- ارتباط ژنهای *DISC1* و *dysbindin* با هر دو دسته اختلال اسکیزوفرنیا و بای پولار

۴- در مطالعات فوق مانیا بهترین افتراق دهنده بین اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی بوده است

۱۱۸- کدام یک از فاکتورهای زیر کمترین ارتباط را با اختلال فانکشن در بیمار اسکیزوفرنیا دارد؟

۱- دیس ارگانیزیشن

۲- علائم مثبت

۳- علائم منفی

۴- اختلال شناختی



۱۱۹- در مورد بیماری که اخیراً دچار هذیان و توهم و انزوای اجتماعی و **avolition** و **alogia** گردیده است و ظرف یک ماه اخیر برای اولین بار تشخیص برای وی مشخص شده است و درمان شروع گردیده است از نظر سیر اختلال شناختی کدام مورد زیر محتمل تر می باشد؟

- ۱- در حال حاضر نواقص شدید شناختی و سیر پیش رونده این نواقص در طول بیماری
- ۲- در حال حاضر نواقص خفیف شناختی و سیر پیش رونده این نواقص در طول بیماری
- ۳- در حال حاضر نواقص شدید شناختی و سیر تقریباً ثابت این نواقص در طول بیماری
- ۴- در حال حاضر نواقص خفیف شناختی و سیر تقریباً ثابت این نواقص در طول بیماری

۱۲۰- از بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا می خواهیم سری اعداد گفته شده را به طور معکوس تکرار کند. نقص در این عملکرد مرتبط با کدام یک از مناطق کورتکس می باشد؟

- ۱- تمپورال
- ۲- سینگولیت
- ۳- پره فرونتال
- ۴- پاریتال

۱۲۱- در مورد مرد جوان مبتلا به اسکیزوفرنیا با علائم منفی اولیه و نیز ثانویه به **EPS**، که اختلال فرم فکر و رفتارهای بیزارو نیز افکار خود کشی دارد و ظرف ۶ هفته به الانزایین ۲۰ میلی گرم روزانه پاسخ خوبی نداده است، کدام گزینه زیر را پیشنهاد می کنید؟

- ۱- ریسپریدون ۸ میلی گرم در روز و ادامه آن حداقل ۶ هفته
- ۲- کلوزاپین ۴۰۰ میلی گرم در روز و ادامه آن حداقل ۶ هفته
- ۳- ریسپریدون ۶ میلی گرم و ادامه آن حداقل ۶ ماه
- ۴- کلوزاپین ۳۰۰ میلی گرم و ادامه آن حداقل ۶ ماه

۱۲۲- کدام یک از موارد زیر در مورد مقایسه داروهای نسل اول (**FGA**) و نسل دوم (**SGA**) در درمان اسکیزوفرنیا صحیح می باشد؟

- ۱- داروهای **SGA** قابل تحمل تر می باشد
- ۲- داروهای **SGA** بر روی علائم منفی اولیه تاثیر بیشتری دارند.
- ۳- برای بیماران با اختلالات شناختی، داروهای **FGA, SGA** هر دو به یک میزان مناسب می باشند.
- ۴- با داروهای **SGA** عود کمتری اتفاق می افتد.

۱۲۳- در بیماری با شروع حاد سایکوز ظرف ۲ روز اخیر به دنبال یک استرسور محیطی و واضح و نیز فقدان سابقه اختلال سایکوتیک، توجه به کدام یک از موارد زیر از نظر تشخیصهای افتراقی مهم، اهمیت کمتری دارد؟

- ۱- تغییرات هوشیاری و نوسانات آن در طول شبانه روز
- ۲- تست های سم شناسی از نظر مواد
- ۳- معاینه فیزیکی، تستهای آزمایشگاهی و تصویر برداری
- ۴- وجود علائم تجزیه ای

۱۲۴- در مورد بیماری با هذیان **Jealousy** بدون علائم دیگر ملاک **A** اسکیزوفرنیا، کدام گزینه در مورد سیر بیماری صحیح نمی باشد؟

- ۱- بهتر شدن سیر در صورت وجود افسردگی همراه
- ۲- حفظ بهتر عملکرد نسبت به اسکیزوفرنیا
- ۳- شروع معمولاً در سن بالاتر از اسکیزوفرنیا
- ۴- نامشخص بودن اثر سن شروع بر پیش آگهی



۱۲۵- برای حملات تکانشی aggression در اختلال intermittent explosive disorder کدام یک از راهکارهای زیر کمتر موثر است؟

۱- فلووکسامین

۲- والپروات سدیم

۳- کربنات لیتیم

۴- ریسپریدون

۱۲۶- در مورد سیر اختلال انطباقی (adjustment) در نوجوانان و بزرگسالان کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

۱- سیر آن در نوجوانان خوش خیم تر است.

۲- در نوجوانان به تشخیص طیف محدود تری از اختلالات روانپزشکی ممکن است منتهی گردد

۳- مزمن بودن علائم بهترین پیش بینی کننده پیش آگهی ضعیف است

۴- درصد بهبودی در پی گیری دراز مدت در نوجوانان بیشتر است

۱۲۷- خانمی پزشک، همسر معناداری دارد که وی را مورد آزار فیزیکی قرار می دهد. با این وجود تمایل به ادامه زندگی با وی دارد. در گذشته نیز پدری داشته که همین رفتار آزار فیزیکی را نسبت به وی داشته است. در حال حاضر برای وی تشخیص اختلال انطباقی مزمن گذاشته شده است. کدام یک از روشهای درمانی زیر بیشتر توصیه می گردد؟

۱- درمان حمایتی کوتاه مدت

۲- درمان روانپوشی طولانی مدت

۳- درمان شناختی

۴- درمان رفتاری

۱۲۸- برای دختر خانمی که اخیراً "مورد rape قرار گرفته است و ترس از مردان مانع حضور وی در کلاسهای درس می گردد، کدامیک از روشهای درمانی زیر کمتر قابل توصیه است؟

۱- cognitive behavior therapy

۲- interpersonal psychotherapy

۳- exposure therapy

۴- Eye Movement Desensitization and Reprocessing

۱۲۹- کدام یک از سندرم های وابسته به فرهنگ (culture-bound) به نوعی اختلال اضطراب اجتماعی از نوع خاور دور محسوب می گردد و درمان دارویی نیز در آن موثر می باشد؟

۱- koro

۲- Hwa- byung

۳- shenjing shuairuo

۴- taijin kyofusho

۱۳۰- برای مادری که پس از زایمان دچار حمله مانیا شده است و فرزند خود را نیز شیر می دهد، تجویز کدام یک از ترکیبات زیر مناسب تر می باشد؟

۱- پرفنازین، کربنات لیتیم

۲- پرفنازین، بی پریدین، کربنات لیتیم

۳- پرفنازین، والپروات سدیم

۴- پرفنازین، بی پریدین، والپروات سدیم



۱۳۱- کدام اختلال اضطرابی شیوع جنسی برابر دارد؟

۱- Panic

۲- O.C.D

۳- G.A.D

۴- P.T.SD

۱۳۲- مرد میانسالی که دچار مشکلات مالی و خانوادگی است ناگهان ناپدید شده و پس از چند روز در شهر مجاور پیدا می شود. در حالیکه خود را شخص دیگری می نامد و در مورد گذشته خود و شغل و اعضای خانواده چیزی به خاطر نمی آورد. مشکل جسمی و مصرف مواد نداشته ، کدام تشخیص محتمل است ؟

۱- Dissociative Identity disorder

۲- Dissociative Amnesia

۳- Dissociative fugue

۴- Depersonalization disorder

۱۳۳- خانمی به درمانگاه روانپزشکی مراجعه و ادعا می کند مدتی است تمایل زیادی به تقلید و یا ایجاد علائم بیماریهای جسمی دارد که چند بار منجر به بستری وی در بخشهای داخلی و جراحی گردیده و جهت درمان روانپزشکی تقاضای بستری می کند. در بررسی شواهدی مبنی بر بستری و یا جراحی وی وجود نداشت . کدام تشخیص مطرح است ؟

۱- Hospital hopper syndrome

۲- Factitious disorder with psychological symptom

۳- Peregrinating Syndrom

۴- Munchausen Syndrom

۱۳۴- در رواندرمانی اختلالات خوردن کدام مورد زیر کمتر توصیه می شود ؟

۱- مداخلات رفتاری بوسیه پاداش و تنبیه

۲- رواندرمانی بین فردی

۳- آموزش روانی

۴- رواندرمانی حمایتی

۱۳۵- مرد مسن چاقی با شکایت از خرخر کردن ، خواب منقطع و خواب آلودگی روزانه و بی حالی مراجعه کرده . کدام درمان ارجح است ؟

۱- فشار مثبت مداوم هوای بینی

۲- جراحی بینی

۳- کاهش وزن

۴- تراکتوستومی

۱۳۶- همه موارد زیر جزء علائم ناركولپسی است بجز :

۱- کاتاپلکسی

۲- فلج خواب

۳- کاتالپسی

۴- خواب آلودگی



۱۳۷- کدام اختلال جنسی زیر همیشه علت جسمی دارد؟

- ۱- Retrograde ejaculation
- ۲- Anorgasmia
- ۳- Dysparonia
- ۴- Erectile dysfunction

۱۳۸- مصرف طولانی همه مواد زیر باعث کاهش تستوسترون می شود بجز:

- ۱- Alcohol
- ۲- Cannabis
- ۳- L.S.D
- ۴- Opium

۱۳۹- علامت Psudologia Funtastica بیشتر در کدام اختلال زیر دیده می شود؟

- ۱- Schizophernia
- ۲- P.T.S.D
- ۳- hypochondriasis
- ۴- Munehausen

۱۴۰- خانم جوانی توسط جراح ترمیمی جهت مشاوره ارجاع گردیده وی نگرانی زیادی در خصوص زشت بودن ظاهر بخصوص بینی و پوست خود را دارد و درخواست جراحی بینی کرده به رغم اینکه ظاهر وی طبیعی می باشد. کدام درمان مناسب تر است؟

- ۱- فلوکستین
- ۲- کلومی پرامین
- ۳- رواندرمانی تحلیلی
- ۴- رفتار درمانی شناختی

۱۴۱- بیماری که از زندان ارجاع شده در پاسخ به سوال میز چند پایه دارد می گوید: پنج عدد وی گیج به نظر می رسد و زیر لب با خود صحبت می کند کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟

- ۱- Ganser syndrom
- ۲- Dissociative Amnesia
- ۳- Malingering
- ۴- Schizophrenia

۱۴۲- خانم جوانی را ویزیت می کنید که روز قبل ضمن مشاجره با رئیس خود از کار اخراج شده است. وی خاطره مربوط به مشاجره را تا حدودی و اخراج را کاملاً فراموش کرده ولی بقیه وقایع آنروز را به خاطر دارد. کدام نوع فراموشی تجزیه ای مطرح است؟

- ۱- Sytematized
- ۲- Selective
- ۳- Localized
- ۴- continuous



۱۴۳- *la belle indifference* بیشتر در کدام اختلال زیر دیده می شود؟

- ۱- conversion disorder
- ۲- hypochondriasis
- ۳- Body Dysmorphic disorder
- ۴- Pain disorder

۱۴۴- جانبازی که علیرغم درمانهای مختلف هنوز دچار کابوس های شبانه است و خاطرات جنگ او را می آزارد و از آن اجتناب می کند به شما مراجعه کرده جدیدترین رواندرمانی را که به او پیشنهاد می کنید کدام است؟

- ۱- supportive
- ۲- Exposure therapy
- ۳- E.M.D.R
- ۴- Stress Inoculation training

۱۴۵- بیماری که در آسانسور دچار وحشت شدید، طپش قلب و ترس می شود و از آن می پرهیزد، دچار کدام نوع ترس مرضی است؟

- ۱- Enviromental
- ۲- Nonspecific
- ۳- Situational
- ۴- Generalized

۱۴۶- مرد جوانی را ویزیت می کنید که از حضور در جمع دچار شرم و اضطراب می شود و از ان اجتناب میکند درحالیکه علاقمند به فعالیت های اجتماعی است. همه داروهای زیر جهت درمان توصیه میشود بجز:

- ۱- بوسیپرون
- ۲- الپرازولام
- ۳- پروپرانولول
- ۴- ونلافاکسین

۱۴۷- هویت جنسی در چه سنی شکل می گیرد؟

- ۱- ۲-۳ سالگی
- ۲- ۳-۵ سالگی
- ۳- سن مدرسه
- ۴- نوجوانی

۱۴۸- مرد میانسالی به مطب مراجعه کرده و در مصاحبه روانپزشکی بیماری وی **O.C.D** تشخیص داده می شود و اختلال روانی دیگری ندارد اولین و مهمترین اقدام شما کدام است؟

- ۱- شروع رواندرمانی
- ۲- معاینه و بررسی نورولوژیک
- ۳- درمان دارویی
- ۴- انجام تست های روانشناسی



۱۴۹- خانم میان سالی دچار ضایعات پوستی و دهان شده در معاینه و انجام نمونه برداری آلرژی مطرح گردیده و سرطان رد می شود اما پیگیری ۶ ماهه توصیه می شود وی دچار اضطراب شدید مداوم شده است چه تشخیصی مطرح است؟

G.A.D-۱

Phobia-۲

Anxiety disorder Nos-۳

O.C.D-۴

۱۵۰- کدامیک از گزینه های زیر در تعریف هویت جنسی (Sexual Identity) جای نمی گیرد؟

۱- حس تعلق داشتن به یک جنسیت

۲- صفات ثانویه جنسی

۳- ترکیب هورمونی و کروموزومی

۴- اعضاء جنسی داخلی و خارجی

۱۵۱- بیمار مبتلا به عفونت HIV در مطب شما از اینکه همسر خود را از این موضوع آگاه کند طفره می رود. همسر وی حامله و در

اتاق انتظار حضور دارد، واکنش شما چیست؟

۱- هم اکنون همسر وی را مطلع می کنم.

۲- راز بیمارمان را حفظ می نمایم.

۳- بیمار را به پزشک دیگری ارجاع می دهیم.

۴- به همسرش اقدامات حفاظتی را گوشزد کرده بدون اینکه از موضوع بیماری حرف بزنیم.

۱۵۲- صبح روز ویزیت متوجه می شوید که یکی از پزشکان رفتارهای عجیبی دارد و تنفس او بوی الکل می دهد، فقط شما متوجه

این موضوع شده اید، واکنش شما چیست؟

۱- چون در سطح پایین تری هستید هیچ اقدامی انجام نمی دهید.

۲- به مدیر گروه اطلاع می دهید.

۳- فقط به بیمار اطلاع می دهید چون پزشک رفتار عجیب دارد.

۴- مستقیماً و به تنهایی با خودش در میان می گذارید، اگر توجه نکرد به مسول مربوطه اطلاع می دهید.

موفق باشید

- دستیاران گرامی می توانند پس از اعلام کلید اولیه آزمون، از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۸ لغایت

ساعت ۱۸ روز جمعه مورخ ۹۴/۵/۹ اعتراضات خود را صرفاً از طریق وب سایت <http://sanjeshp.kmu.ac.ir>

به دبیرخانه آزمون ارسال نمایند. بدیهی است پذیرش اعتراضات بعد از زمان اعلام شده مقدور نخواهد بود.